



目の健康について学ぶ参加者=県医師会館

白内障は、この後症をする水晶体が混濁して透明性が失われる病気。糖尿病による白内障は、進行具合により「真性糖尿病白内障」と「仮性糖尿病白内障」の2種類に大別される。



山根伸太・徳島県眼科学会会長

早期治療で重症化回避

ため新生血管が発生する
が、新生血管はもろいた
め出血しやすく、硝子体
出血や網膜はく離などを
引き起こす。

糖尿病網膜症は糖尿病
に取り組んでほしい。

まずは糖尿病という病
気を十分理解した上で、
定期健診や治療に向き
き障害を避けることがで
きる。

The diagram illustrates the internal structure of the eye, showing the lens, iris, and surrounding tissue. To the right, a vertical flowchart details the process of cataract formation:

- ソルビトールに変化
- 忽略な低血糖
- 水晶体内外の浸透圧バランスの崩壊
- 液水の水晶体内異常移行
- 白内障

—糖尿病の眼合併症—

卷之三

糖尿病の眼合併症

徳島県眼科医会会長 山根伸太氏

血糖コントロール重要

糖尿病による眼合併症として①網膜症②白内障③屈折、調節変動④外眼筋痙攣⑤ぶどう膜炎⑥緑内障⑦視神経障害⑧電気生理学的異常などが挙げられる。

特に糖尿病網膜症は糖尿病腎症、神経症とともに糖尿病の3大合併症の一つでもある。今回は白

糖尿病特有の形では、血糖コントロールと関係なく、ステロイドの長期投与、ぶどう膜炎などに続発して起るタイプ。が強い時に、水晶体の膨

期間や血糖コントロールなどに関係なく突然発症する。

金匱要略

及ぶことで、左右の眼球運動のバランスが崩れて物が二重に見えるようになつたり、まぶたが垂れ下がつたりする。特徴としては、40歳以上の中高年に多く、糖尿病の治療

外眼筋麻痺は、眼球運動を担う動眼神経、外転神経、滑車神経に障害が障害により近視や遠視の症状が現れる。

ル重

かりつけ
4

でやめてしまふ
のコントロール
いばかりか
際に効いて
か診断しない
点眼薬は
類があるの

上の罹患

専門医の診
いた方がよ
じて視野検
れることが
残念なが
れた視神経
法はなく、
度を遅らせ
の目標とな
一歩は、眼
トロールし
担を減らす
としては古
薬、手術、
などが挙げ

察を受けてお
い。病状に応
じて検査などを行わ
る。

ら一度障害さ
れを元に戻す方
病気の進行速
くことが治療
する。治療の第
一歩を低くコント
ロールして神経への負
担を減らすこと。
治療法は、内服
薬、外用薬、レーザー治療
等が行われる。

献眼登録とアイバンク

に角膜を貢献することです。昭和55年に創設した認定アイバンクでの献血登録累計3,501名、献血者累計73名、角膜移植累計123眼、手術待機者134名。

腎器移植法での角膜移植は心臓や肝臓移植と同じ扱いを受けますが、角膜と腎臓は心臓死のあとでもご遺族の申し出があれば腎器提供が可能でその善意が生かされます。